



BEVACIZUMABE

O Bevacizumabe é um anticorpo monoclonal utilizado no tratamento de vários tipos de cânceres.

Sua forma de administração é endovenosa (pela veia).

Os anticorpos monoclonais agem diretamente contra antígenos das células tumorais, diminuindo sua ação nas células saudáveis.



Como ocorre um ciclo de anticorpo monoclonal?

Os tratamentos oncológicos são administrados em ciclos, que são compostos pelos dias de infusão das medicações contra o câncer e também pelo tempo de descanso para permitir que seu corpo se recupere. Para os anticorpos monoclonais não é diferente!

Usualmente, os ciclos são a cada 2 semanas, 3 semanas, entre outros, a depender da droga que está sendo administrada.

Após o término de um ciclo, um novo ciclo se inicia.



1

Infusão dos anticorpos monoclonais



O Bevacizumabe é administrado pela veia em aproximadamente 1h 30 minutos.

2

Efeitos colaterais



Diferentemente das quimioterapias que possuem efeitos colaterais imediatos, os efeitos colaterais dos anticorpos monoclonais geralmente aparecem após a 2ª semana de tratamento, podendo ocorrer em qualquer momento, inclusive após meses do início do tratamento.

Cheque na página de efeitos colaterais os principais eventos adversos que esta medicação pode apresentar e o tempo médio de surgimento. Atente-se aos sinais de alerta.

4

Consulta médica



O(a) médico(a) avaliará seus exames e a presença dos efeitos adversos e irá avaliar a liberação do próximo ciclo de anticorpo monoclonal.

Caso seus exames estejam alterados e isso impossibilite o próximo ciclo de tratamento, siga os cuidados recomendados pelo seu médico.

Atrasar o tratamento pode ser necessário até que o seu exame de sangue normalize ou seus efeitos adversos diminuam e a infusão da medicação seja segura.

3

Realização de exames de sangue



Os exames laboratoriais devem ser realizados poucos dias antes do próximo ciclo do anticorpo monoclonal, podendo ser espaçados conforme critério médico.

Quando os exames forem solicitados, a preferência é que a coleta seja realizada 48h antes da próxima infusão.



O ciclo do Bevacizumabe depende do protocolo em uso. Ao lado, têm-se o exemplo: D1 a cada 21 dias. Os exames laboratoriais deverão ser realizados conforme critério médico.



Reações tardias

(Aparecem após 24h da infusão ou mais)

Esta medicação **NÃO** causa queda de cabelo

Cansaço

Dor de cabeça

Febre acima de 37,8°C

Boca inflamada/feridas

Perda de apetite e de peso

Batimento cardíaco irregular, seguido de dificuldade para respirar

Diarreia

Dor muscular

Pressão alta – Hipertensão

Em mulheres: falência ovariana

Hemorragias (sangramento nasal, vaginal, tumoral, na tosse)

Má cicatrização

Eventos tromboembólicos

Edema periférico

Reações imediatas

(Aparecem do momento da administração até 24h após a administração)

Hipertensão

Dor de cabeça

Dor torácica

Leve dor ou sensibilidade no local da injeção

Diarreia

Suor excessivo

Variação na oxigenação

Calafrios



Atenção

O médico poderá pedir para interromper a medicação 28 dias antes de qualquer cirurgia.



HB ONCO



Sinais de alerta

Caso apresente estes sintomas, entre em contato com a equipe responsável ou procure o serviço de emergência mais próximo



Tosse persistente,
ou falta de ar



Fraqueza
intensa



Três ou mais
episódios de diarreia



Níveis pressóricos
>180 de sistólica

Em caso de dúvidas, ligue:

Segunda a Sexta-feira (8h às 17h): (17) 3201-5086.
Finais de semana e feriados: Serviço de Emergência
do Hospital de Base.



Cuidados Gerais

Durante o tratamento com anticorpo monoclonal:



Atenção aos sinais de hipertensão arterial (dor no peito, tontura, visão embaçada, etc). Se necessário, procure uma avaliação no serviço de Emergência do Hospital de Base



Esta medicação pode causar sangramentos! Evite depilar-se com giletes e cuidado ao fazer uso de utensílios cortantes. Em caso de sangramento ativo, procure uma avaliação no serviço de Emergência do Hospital de Base



Gravidez é uma contra-indicação absoluta durante o tratamento. Você e seu(a) parceiro(a) deverão utilizar métodos contraceptivos.

Durante a infusão dos anticorpos monoclonais



Alguns medicamentos, quando administrados **fora da veia**, podem causar **dores, queimação, inchaço** ou **vermelhidão** e outros sintomas, que podem ser sentidos durante a medicação ou dias depois. Caso isso aconteça, **a equipe de enfermagem deverá ser avisada**.



Cuidados gerais com a alimentação

Fracione as refeições ao longo do dia, tenha uma alimentação saudável e variada;

Evite alimentar-se fora de casa;

Descongele os alimentos na geladeira, de um dia para o outro, ou no microondas, nunca em cima da pia ou dentro da água e se atente aos prazos de validade, cor e cheiro dos alimentos;

Higienize todas as frutas, verduras e legumes e deixe de molho de 15 a 20 minutos na solução clorada: 1 colher de sopa de água sanitária sem perfume para cada litro de água ou hipoclorito de sódio;



Mucosite (feridas na boca) / Odinofagia (Dor ao engolir)

Prefira preparações pastosas, em temperatura ambiente e/ou geladas, macias e fáceis de mastigar (purê, vitamina, sopa);

Evite: alimentos duros, secos, ásperos, salgados, ácidos, apimentados e condimentados;

Prefira frutas e legumes macios, bem cozidos ou amassados.



Diarreia

Beba bastante líquidos (água filtrada, água de coco, chás);

Prefira o consumo de alimentos que “prendem o intestino”, como: batata, maisena, banana prata, limão, maçã sem casca.



Falta de apetite

Evite tomar líquidos durante as refeições, principalmente no almoço e jantar;

Enriqueça a preparação com azeite de oliva, ovo e queijos em sopas, polentas e purês;

Entre as refeições, consuma vitaminas de frutas, iogurtes, mingaus, podendo adicionar leite em pó;

Durante a perda de apetite, suplementos podem ajudar. Mas procure um nutricionista para avaliar o tipo e quantidade mais indicado para seu caso.



Em caso de dúvidas e/ou necessidade de individualização sobre alimentação ou outro sinal e sintoma presente, procure um nutricionista.

Fontes:

Bula Medicinanet. Acesso em Nov/2021.

Manual Imunoterapia, AC Camargo. Acesso em Nov/2021.

Bevacizumab: frasco ampoja. Responsável técnico Tatiana Tsiomis Diaz. São Paulo: Roche, 2019. Bula de remédio. Acesso em Nov/2021.

BC Cancer Drug Manual. Bevacizumab: informações sobre medicamentos ao paciente. Revisão Março 2021. Acesso em Nov/2021.

UpToDate. Disponível em: < <http://www.uptodate.com>>. Acesso em Nov/2021.

I Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica da SBNO, 2021. Orientações Funfarme. Acesso em Out/2021.



Aponte a câmera do seu celular e saiba mais sobre outros tratamentos.



Alô enfermeiro
(17) 3201-5086

Contato telefônico para pacientes atendidos no Hospital de Base

Elaborado por: Equipe de Enfermagem, Farmácia e Nutrição do Serviço de Terapia Antineoplásica do Hospital de Base de São José do Rio Preto/ SP.

Revisado por: Dra. Aline Fusco Fares (médica oncologista), Ana Cláudia de Almeida Soares (farmacêutica oncológica), Isabela C. Antunes de Souza (enfermeira oncológica) e Natália F. Duran Leite (nutricionista)

