



DARATUMUMABE

O Daratumumabe é um anticorpo monoclonal utilizado em pacientes com Mieloma Múltiplo.

Sua forma de administração pode ser endovenosa (pela veia) ou subcutânea.

Os anticorpos monoclonais agem diretamente contra antígenos das células tumorais, diminuindo sua ação nas células saudáveis.



Como ocorre um ciclo de anticorpo monoclonal?

Os tratamentos oncológicos são administrados em ciclos, que são compostos pelos dias de infusão das medicações contra o câncer e também pelo tempo de descanso para permitir que seu corpo se recupere. Para os anticorpos monoclonais não é diferente!

Usualmente, os ciclos são a cada 2 semanas, 3 semanas, entre outros, a depender da droga que está sendo administrada.

Após o término de um ciclo, um novo ciclo se inicia.



1

Infusão dos anticorpos monoclonais



O tempo de infusão do Daratumumabe, quando administrado pela veia, dependerá do ciclo em que o paciente está.

2

Efeitos colaterais



Diferentemente das quimioterapias que possuem efeitos colaterais imediatos, os efeitos colaterais dos anticorpos monoclonais geralmente aparecem após a 2ª semana de tratamento, podendo ocorrer em qualquer momento, inclusive após meses do início do tratamento.

Cheque na página de efeitos colaterais os principais eventos adversos que esta medicação pode apresentar e o tempo médio de surgimento. Atente-se aos sinais de alerta.

4

Consulta médica



O(a) médico(a) avaliará seus exames e a presença dos efeitos adversos e irá avaliar a liberação do próximo ciclo de anticorpo monoclonal.

Caso seus exames estejam alterados e isso impossibilite o próximo ciclo de tratamento, siga os cuidados recomendados pelo seu médico.

Atrasar o tratamento pode ser necessário até que o seu exame de sangue normalize ou seus efeitos adversos diminuam e a infusão da medicação seja segura.

3

Realização de exames de sangue



Os exames laboratoriais devem ser realizados poucos dias antes do próximo ciclo do anticorpo monoclonal, podendo ser espaçados conforme critério médico.

Quando os exames forem solicitados, a preferência é que a coleta seja realizada 48h antes da próxima infusão.



O intervalo do ciclo do Daratumumabe depende do ciclo em que o paciente está. Ao lado, têm-se o exemplo: D1, D8, D15 e D22 a cada 28 dias. Os exames laboratoriais deverão ser realizados conforme critério médico.



Reações tardias

(Aparecem após 24h da infusão ou mais)

Esta medicação **NÃO** causa queda de cabelo

Dor de cabeça

Febre acima de 37,8°

Arritmia

Tosse e falta de ar

Infecção do sistema respiratório e pneumonia

Náusea/vômito

Diarreia

Espasmo muscular - contração dos músculos

Inchaço nos braços e/ou pernas

Diminuição de células de defesa - neutropenia e das plaquetas - plaquetopenia

Anemia

Neuropatia periférica - fraqueza, dormência e dor nas mãos e pés

Cansaço

Reações imediatas

(Aparecem do momento da administração até 24h após a administração)

Febre acima de 37,8°

Alergia durante a infusão - tontura, tremor, coceira, falta de ar, pressão alta, tosse, calafrios

Náusea

Diarreia



Atenção

Informe ao médico todas as medicações de uso domiciliar.



HB ONCO



Sinais de alerta

Caso apresente estes sintomas, entre em contato com a equipe responsável ou procure o serviço de emergência mais próximo



Tosse persistente,
ou falta de ar



Fraqueza
intensa



Três ou mais
episódios de diarreia

Em caso de dúvidas, ligue:

Segunda a Sexta-feira (8h às 17h): (17) 3201-5086.
Finais de semana e feriados: Serviço de Emergência
do Hospital de Base.



Cuidados Gerais

Durante o tratamento com anticorpo monoclonal:



Você pode sentir cansaço (respeite os limites do seu corpo e, se possível, realize uma atividade dentro do seu ritmo)



Cuide da sua alimentação (evite gorduras, alimentos prontos e mal cozidos). Não é necessário excluir o açúcar da sua alimentação, faça o consumo com moderação e evite excessos.



Gravidez é uma contra-indicação absoluta durante o tratamento. Você e seu(a) parceiro(a) deverão utilizar métodos contraceptivos.

Durante a infusão dos anticorpos monoclonais



Alguns medicamentos, quando administrados **fora da veia**, podem causar **dores, queimação, inchaço** ou **vermelhidão** e outros sintomas, que podem ser sentidos durante a medicação ou dias depois. Caso isso aconteça, **a equipe de enfermagem deverá ser avisada**.



Cuidados gerais com a alimentação

Fracione as refeições ao longo do dia, tenha uma alimentação saudável e variada;

Evite alimentar-se fora de casa;

Descongele os alimentos na geladeira, de um dia para o outro, ou no microondas, nunca em cima da pia ou dentro da água e se atente aos prazos de validade, cor e cheiro dos alimentos;

Higienize todas as frutas, verduras e legumes e deixe de molho de 15 a 20 minutos na solução clorada: 1 colher de sopa de água sanitária sem perfume para cada litro de água ou hipoclorito de sódio;



Náuseas e vômitos



Prefira alimentos gelados e/ou temperatura ambiente, secos, sem caldos, leves e pequenas porções;

Evite alimentos gordurosos, frituras, temperados e com cheiro forte.

Diarreia



Beba bastante líquidos (água filtrada, água de coco, chás);

Prefira o consumo de alimentos que “prendem o intestino”, como: batata, maisena, banana prata, limão, maçã sem casca.

Em caso de dúvidas e/ou necessidade de individualização sobre alimentação ou outro sinal e sintoma presente, procure um nutricionista.

Fontes:

Bula Janssen-Cilag. Acesso em Dez/2021.

Manual Imunoterapia, AC Camargo. Acesso em Dez/2021.

DALINVI – Daratumumabe: solução injetável. Responsável técnico Marcos R. Pereira. São José dos Campos: Janssen-Cilag Farmacêutica, 2017. Bula de remédio. Acesso em Dez/2021.

BC Cancer Drug Manual. Daratumumab. Pg. 7-9. Revisão: Dezembro, 2019. Acesso em Dez/2021.

Daratumumabe (intravenoso): informações sobre medicamentos ao paciente. Revisão Novembro, 2021. Disponível em: < <http://www.uptodate.com>>. Acesso em Dez/2021.

I Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica da SBNO, 2021. Orientações Funfarme. Acesso em Out/2021.



Aponte a câmera do seu celular e saiba mais sobre outros tratamentos.



Alô enfermeiro
(17) 3201-5086

Contato telefônico para pacientes atendidos no Hospital de Base

Elaborado por: Equipe de Enfermagem, Farmácia e Nutrição do Serviço de Terapia Antineoplásica do Hospital de Base de São José do Rio Preto/ SP.

Revisado por: Dra. Aline Fusco Fares (médica oncologista), Ana Cláudia de Almeida Soares (farmacêutica oncológica), Isabela C. Antunes de Souza (enfermeira oncológica) e Natália F. Duran Leite (nutricionista)

