




DENOSUMABE

O Denosumabe é um anticorpo monoclonal utilizado para prevenção de eventos relacionados ao esqueleto.

Sua forma de administração é subcutânea.



HB ONCO

Como ocorre o ciclo do Denosumabe

Os tratamentos oncológicos são administrados em ciclos, que são compostos pelos dias de infusão das medicações contra o câncer e também pelo tempo de descanso para permitir que seu corpo se recupere.

Usualmente, os ciclos do Denosumabe são a cada 28 dias.

Após o término de um ciclo, um novo ciclo se inicia.



HB ONCO

1

Infusão do Denosumabe



O Denosumabe deve ser administrado via subcutânea, na parte superior do braço, coxa ou abdômen. A aplicação deve ser feita por um profissional da saúde.

2

Efeitos colaterais



Os efeitos colaterais do Denosumabe podem estar presentes durante todo o período de uso da medicação.

Cheque na página de efeitos colaterais os principais eventos adversos que esta medicação pode apresentar e o tempo médio de surgimento.

Durante o tratamento, dores articulares ou musculares podem ocorrer.

4

Consulta médica



O(a) médico(a) avaliará seus exames e a presença dos efeitos adversos e irá avaliar a liberação do próximo ciclo de anticorpo monoclonal.

Caso seus exames estejam alterados e isso impossibilite o próximo ciclo de tratamento, siga os cuidados recomendados pelo seu médico.

Atrasar o tratamento pode ser necessário até que o seu exame de sangue normalize ou seus efeitos adversos diminuam e a infusão da medicação seja segura.

3

Realização de exames de sangue



Os exames laboratoriais devem ser realizados poucos dias antes do próximo retorno médico.

É importante o acompanhamento de exames de cálcio e fósforo.



O ciclo do Denosumabe ocorre a cada 28 dias, como demonstrado no exemplo ao lado. Os exames laboratoriais deverão ser realizados conforme critério médico.



HB ONCO

Reações tardias

(Aparecem após 24h da infusão ou mais)

Esta medicação
NÃO causa
queda de cabelo

Dor de cabeça

Erupção Cutânea

Náusea

Inchaço periférico

Fratura óssea

Diarreia

Dor osteoarticular e muscular

Alterações sanguíneas

Alteração hidroeletrólítica,
principalmente relacionada
ao cálcio (tanto hipercalcemia
quanto hipocalcemia)

Reações imediatas

(Aparecem do momento da administração até 24h após a administração)

Inchaço Facial

Osteonecrose de mandíbula

Inchaço de vias aéreas

Falta de ar

Ardor/rubor

Hipotensão

Erupção na pele



HB ONCO



Sinais de alerta

Caso apresente estes sintomas, entre em contato com a equipe responsável ou procure o serviço de emergência mais próximo



Fraturas ósseas



Dores musculoesqueléticas



Alterações hidroeletrólíticas (atentar para fraqueza intensa e tremores)



Dores na mandíbula (risco de osteonecrose de mandíbula)

Em caso de dúvidas, ligue:

Segunda a Sexta-feira (8h às 17h): (17) 3201-5086.
Finais de semana e feriados: Serviço de Emergência do Hospital de Base.



Cuidados Gerais

Durante o tratamento com Ácido Zoledrônico:



Realize corretamente os exames laboratoriais solicitados. Caso apresente dor descontrolada em articulações, comunique seu médico ou, se necessário, procure uma avaliação no serviço de Emergência do Hospital de Base.



Cuide da sua alimentação (evite gorduras, alimentos prontos e mal cozidos). Não é necessário excluir o açúcar da sua alimentação, faça o consumo com moderação e evite excessos.



Gravidez é uma contra-indicação absoluta durante o tratamento. Você e seu(a) parceiro(a) deverão utilizar métodos contraceptivos.



Comunique ao seu dentista que você está fazendo uso do Ácido Zoledrônico! Esta medicação pode causar osteonecrose de mandíbula.



Cuidados gerais com a alimentação

Fracione as refeições ao longo do dia;

Evite frituras, gorduras, enlatados, embutidos, alimentos industrializados e alimentar-se fora de casa;

Varie os tipos de carne: carnes vermelhas, frango, peixes, porco e ovos;

Descongele os alimentos na geladeira, de um dia para o outro, ou se preferir, use o microondas. Nunca deixe em cima da pia ou dentro um recipiente com água;

Atente-se aos prazos de validade, cor e cheiro dos alimentos;

Higienize todas as frutas, verduras e legumes e deixe de molho de 15 a 20 minutos na solução clorada;

Preparo da solução clorada: 1 colher de sopa de água sanitária sem perfume para cada litro de água ou hipoclorito de sódio.

Tenha uma alimentação saudável e variada.



Diarreia



Hidrate-se muito (água filtrada, água de coco, chás);

Prefira o consumo de alimentos que “prendem o intestino”, como: batata, maisena, banana prata, limão, maçã sem casca.

Náuseas e vômitos



Prefira alimentos gelados e/ou em temperatura ambiente, secos, sem caldos, leves e pequenas porções;

Evite alimentos gordurosos, frituras, temperados e com cheiro forte.

Em caso de dúvidas e/ou necessidade de individualização sobre alimentação ou outro sinal e sintoma presente, procure um(a) nutricionista.

Fontes:

I Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica da SBNO, 2021.

Orientações Funfarne. Acesso em Mar/2022.

Amgen Biotecnologia do Brasil Ltda. Bula da medicação. Acesso em Dez/2022.

Up to date. Informações sobre a medicação. Acesso em Dez/2022.

Guia Farmacêutico HSL. Acesso em Nov/2022.



HB ONCO

Aponte a câmera do seu celular e saiba mais sobre outros tratamentos.



Alô enfermeiro
(17) 3201-5086

Contato telefônico para pacientes atendidos no Hospital de Base

Elaborado por: Equipe de Enfermagem, Farmácia e Nutrição do Serviço de Terapia Antineoplásica do Hospital de Base de São José do Rio Preto/ SP.

Revisado por: Dra. Aline Fusco Fares (médica oncologista), Ana Cláudia de Almeida Soares (farmacêutica oncológica), Isabela C. Antunes de Souza (enfermeira oncológica) e Natália F. Duran Leite (nutricionista)

