



BORTEZOMIBE

O Bortezomibe é uma terapia alvo utilizada no tratamento de Mieloma Múltiplo e Linfoma não-Hodgkin.

Pode ser utilizado sozinho ou associado a outras medicações.


Sua forma de administração pode ser subcutânea ou endovenosa (pela veia).

Como ocorre um ciclo de terapia alvo?

Os tratamentos oncológicos são administrados em ciclos, que são compostos pelos dias de infusão das medicações contra o câncer e também pelo tempo de descanso para permitir que seu corpo se recupere. Para as terapias alvo não é diferente!

Usualmente, os ciclos são a cada 3 semanas, 4 semanas, mensais, entre outros, a depender da droga que está sendo administrada.

Após o término de um ciclo, um novo ciclo se inicia.



HB ONCO

1

Infusão do Bortezomibe



O Bortezomibe pode ser administrado via subcutânea ou endovenosa, dependendo da dose da medicação.

Nas administrações subcutâneas é importante rodiciar o local da injeção.

2

Efeitos colaterais



Diferentemente das quimioterapias que possuem efeitos colaterais imediatos, os efeitos colaterais das terapias alvo geralmente aparecem após a 2ª semana de tratamento, podendo ocorrer em qualquer momento, inclusive após meses do início do tratamento.

Cheque na página de efeitos colaterais os principais eventos adversos que esta medicação pode apresentar e o tempo médio de surgimento. Atente-se aos sinais de alerta.

4

Consulta médica



O(a) médico(a) avaliará seus exames e a presença dos efeitos adversos e irá avaliar a liberação do próximo ciclo.

Caso seus exames estejam alterados e isso impossibilite o próximo ciclo de tratamento, siga os cuidados recomendados pelo seu médico.

Atrasar o tratamento pode ser necessário até que o seu exame de sangue normalize ou seus efeitos adversos diminuam e a infusão da medicação seja segura.

3

Realização de exames de sangue



Os exames laboratoriais devem ser realizados poucos dias antes do próximo ciclo do anticorpo monoclonal, podendo ser espaçados conforme critério médico.

Quando os exames forem solicitados, a preferência é que a coleta seja realizada 48h antes da próxima infusão.



D1C1 = Dia 1,
Ciclo 1

D8C1 = Dia 8,
Ciclo 1

D15C1 = Dia 15,
Ciclo 1

D1C2 = Dia 1,
Ciclo 2



O ciclo do Bortezomibe depende do protocolo em uso. Ao lado, têm-se o exemplo: D1, D8 e D15 a cada 28 dias. Assim, o exame laboratorial e a consulta médica devem ser programados 1-2 dias antes do próximo ciclo.



HB ONCO

Reações tardias

(Aparecem após 24h da infusão ou mais)

este medicamento
NÃO causa queda
de cabelo

Febre acima de 37,8°C

Estomatite

Sangramentos nasais

Dores musculares

Náuseas/ Vômitos

Diarreia/ Constipação

Perda de apetite, peso

Cansaço/ fraqueza/ Edema

Reações imediatas

(Aparecem do momento da administração até 24h após a administração)

Febre acima de 37,8°C

Insônia

Calafrios e mal
estar/ Fadiga

Tosse/ falta de
ar/ Hipotensão

Ardor no local
da injeção

Náusea/ Vômito

Diarreia/ Constipação

Urticária



Atenção

Comunique seu médico se estiver em uso dos medicamentos: **glimepirida, metformina, repaglinida, pioglitazona** ou **sitagliptina**, pois o Borte-zomibe pode aumentar ou diminuir os efeitos destas medicações.

Informe ao médico todas as medicações de uso domiciliar.



HB ONCO



Sinais de alerta

Caso apresente estes sintomas, entre em contato com a equipe responsável ou procure o serviço de emergência mais próximo



Tosse persistente,
ou falta de ar



Fraqueza
intensa



Três ou mais
episódios de diarreia

Em caso de dúvidas, ligue:

Segunda a Sexta-feira (8h às 17h): (17) 3201-5086.
Finais de semana e feriados: Serviço de Emergência do Hospital de Base.



HB ONCO

Cuidados Gerais

Durante o tratamento com as Terapias Alvo:



Desconfortos no local da injeção podem ocorrer. Neste caso, você poderá aplicar compressa fria por 15 minutos até melhora dos sintomas.




Cuide da sua alimentação (evite gorduras, alimentos prontos e mal cozidos). Não é necessário excluir o açúcar da sua alimentação, faça o consumo com moderação e evite excessos.



Gravidez é uma contra-indicação absoluta durante o tratamento. Você e seu(a) parceiro(a) deverão utilizar métodos contraceptivos.

Durante a infusão do Bortezomibe



Alguns medicamentos, quando administrados **fora da veia**, podem causar **dores, queimação, inchaço** ou **vermelhidão** e outros sintomas, que podem ser sentidos durante a medicação ou dias depois. Caso isso aconteça, **a equipe de enfermagem deverá ser avisada**.



HB ONCO

Cuidados gerais com a alimentação

Fracione as refeições ao longo do dia;

Evite frituras, gorduras, enlatados, embutidos, alimentos industrializados e alimentar-se fora de casa;

Varie os tipos de carne: carnes vermelhas, frango, peixes, porco e ovos;

Descongele os alimentos na geladeira, de um dia para o outro, ou se preferir, use o microondas. Nunca deixe em cima da pia ou dentro um recipiente com água;

Atente-se aos prazos de validade, cor e cheiro dos alimentos;

Higienize todas as frutas, verduras e legumes e deixe de molho de 15 a 20 minutos na solução clorada;

Preparo da solução clorada: 1 colher de sopa de água sanitária sem perfume para cada litro de água ou hipoclorito de sódio.

Tenha uma alimentação saudável e variada.



Diarreia



Hidrate-se muito (água filtrada, água de coco, chás);

Prefira o consumo de alimentos que “prendem o intestino”, como: batata, maisena, banana prata, limão, maçã sem casca.

Náuseas e vômitos



Prefira alimentos gelados e/ou em temperatura ambiente, secos, sem caldos, leves e pequenas porções;

Evite alimentos gordurosos, frituras, temperados e com cheiro forte.

Constipação (Intestino preso)



Hidrate-se muito (água filtrada, água de coco, chás). Tente ingerir no mínimo 8 copos de água por dia;

Inclua na rotina, vegetais folhosos, como alface, couve, rúcula e não se esqueça dos legumes no almoço e jantar;

Coma frutas todos os dias (mamão, laranja com bagaço, acerola, ameixa).

Em caso de dúvidas e/ou necessidade de individualização sobre alimentação ou outro sinal e sintoma presente, procure um nutricionista.

Fontes:

BC Cancer. Acesso em Nov/2021.

INCA. Acesso em Nov/2021. BORTEZOMIBE, medicamento genérico: frasco-ampola. Laboratórios Dr. Reddy's. Farmacêutica do Brasil Ltda., 2021. Bula de remédio. Acesso em Dez/2021.

BC Cancer Drug Manual, 2006. Bortezomib. Acesso em Dez/2021.

I Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica da SBNO, 2021.

Orientações Funfarne, acessado em Out/2021.



HB ONCO

Aponte a câmera do
seu celular e saiba
mais sobre outros
tratamentos.



Alô enfermeiro
(17) 3201-5086

Contato telefônico para pacientes atendidos no Hospital de Base

Elaborado por: Equipe de Enfermagem, Farmácia e Nutrição do Serviço de Terapia Antineoplásica do Hospital de Base de São José do Rio Preto/ SP.

Revisado por: Dra. Aline Fusco Fares (médica oncologista), Ana Cláudia de Almeida Soares (farmacêutica oncológica), Isabela C. Antunes de Souza (enfermeira oncológica) e Natália F. Duran Leite (nutricionista)



HB ONCO