



# GEFITINIBE

O Gefitinibe é um inibidor de tirosina quinase para pacientes com mutação no gene EGFR utilizado em casos de câncer de pulmão.

Apresentação disponível no mercado: comprimidos revestidos de 250mg.

## MODO DE USAR:



Seguir a prescrição médica respeitando o mesmo horário de tomada da medicação.

## ONDE ARMAZENAR:



Conservar em temperatura ambiente (15°C a 30°C). Proteger da luz e da umidade.



HB ONCO

## ORIENTAÇÕES GERAIS



### **Não consigo ingerir o comprimido inteiro. O que fazer?**

Caso não seja possível ingeri-los inteiros comunique seu médico ou entre em contato com o serviço para uma avaliação.



### **E se eu vomitar após ingerir o comprimido/cápsula?**

Não tome outro comprimido. Espere até o horário da dose seguinte e tome normalmente.

Não esqueça de comunicar seu médico sobre este episódio e, se necessário, solicite medicações para controle da náusea.



### **E se eu esquecer de tomar o comprimido?**

Espere até o horário da dose seguinte e tome normalmente. Evite doses extras.

Cuidado: o esquecimento de uma dose pode comprometer o resultado do tratamento.



### **Cuidados com a pele:**

É importante que alguns cuidados sejam tomados durante o tratamento: evitar exposição direta ao sol (utilizar bonés, protetor solar) principalmente entre os horários das 10h e 16h, hidratar a pele com hidratantes sem álcool e aumentar o consumo de líquidos.



# Como ocorre um ciclo de terapia alvo oral?

Os tratamentos oncológicos são realizados em ciclos, que são compostos pela administração de medicações contra o câncer.

Comumente estas medicações são utilizadas de forma contínua, podendo ser espaçadas de acordo com o critério médico.



## 1 Uso da medicação



Ingestão de comprimido de acordo com a prescrição médica.

## 2 Efeitos colaterais



Os efeitos colaterais das terapias alvo orais podem estar presentes durante todo o período de uso da medicação.

Cheque na página de efeitos colaterais os principais eventos adversos que esta medicação pode apresentar.

## 4 Consulta médica



O(a) médico(a) avaliará seus exames e a presença dos efeitos adversos e irá avaliar a liberação do próximo ciclo da terapia alvo.

Caso você não esteja apto, siga os cuidados recomendados pelo seu médico.

Atrasar o tratamento pode ser necessário até que o seu exame de sangue normalize ou seus efeitos adversos diminuam.

## 3 Realização de exames de sangue



Os exames laboratoriais devem ser realizados poucos dias antes do próximo retorno médico.

É importante o acompanhamento da função hepática.



O uso do Gefitinibe é contínuo, podendo ser espaçado à critério médico.



## Principais reações adversas

Queda de cabelo rara  
(cerca de 5% dos  
pacientes)

Feridas na boca

Diminuição do Apetite


Alterações da pele,  
coceira, pele seca,  
espinhas (acne)

Alterações nos exames do fígado

Diarreia

Náusea/ Vômito

Cansaço / Fraqueza



### **Interação medicamento e alimentos:**

Evite o consumo simultâneo de toranja durante o tratamento.





## Sinais de alerta

Caso apresente estes sintomas, entre em contato com a equipe responsável ou procure o serviço de emergência mais próximo



Tosse persistente ou falta de ar (pneumonia droga-induzida)



Fraqueza intensa



Três ou mais episódios de diarreia

Quando precisar de avaliação hospitalar, a preferência deverá ser sempre o serviço de emergência do serviço de origem, no caso, o Hospital de Base.

**Em caso de dúvidas, ligue:**

**Segunda a Sexta-feira (8h às 17h): (17) 3201-5086.  
Finais de semana e feriados: Serviço de Emergência do Hospital de Base.**



## Cuidados gerais com a alimentação

Fracione as refeições ao longo do dia;

Evite frituras, gorduras, enlatados, embutidos, alimentos industrializados e alimentar-se fora de casa;

Varie os tipos de carne: carnes vermelhas, frango, peixes, porco e ovos;

Descongele os alimentos na geladeira, de um dia para o outro, ou se preferir, use o microondas. Nunca deixe em cima da pia ou dentro um recipiente com água;

Atente-se aos prazos de validade, cor e cheiro dos alimentos;

Higienize todas as frutas, verduras e legumes e deixe de molho de 15 a 20 minutos na solução clorada:

Preparo da solução clorada: 1 colher de sopa de água sanitária sem perfume para cada litro de água ou hipoclorito de sódio.

Tenha uma alimentação saudável e variada.



## Diarreia



Hidrate-se muito (água filtrada, água de coco, chás);

Prefira o consumo de alimentos que “prendem o intestino”, como: batata, maisena, banana prata, limão, maçã sem casca.

## Náuseas e vômitos



Prefira alimentos gelados e/ou em temperatura ambiente, secos, sem caldos, leves e pequenas porções;

Evite alimentos gordurosos, frituras, temperados e com cheiro forte.

## Mucosite (feridas na boca) / Odínofagia (Dor ao engolir)



Prefira preparações pastosas, em temperatura ambiente e/ou geladas, macias e fáceis de mastigar (purê, vitamina, sopa);

Evite: alimentos duros, secos, ásperos, salgados, ácidos, apimentados e condimentados;

Prefira frutas e legumes macios, bem cozidos ou amassados.

Em caso de dúvidas e/ou necessidade de individualização sobre alimentação ou outro sinal e sintoma presente, procure um(a) nutricionista.

### Fontes:

I Consenso Brasileiro de Nutrição Oncológica da SBNO, 2021.

Orientações Funfarme. Acesso em Mar/2022.

AstraZeneca. Bula do medicamento. Disponível em: <https://www.4bio.com.br/wp-content/uploads/2019/06/lressa-431.pdf>. Acesso em Set/2022.

BC Cancer - Manual da droga. Disponível em: [http://www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Ge-fitinib\\_monograph\\_1April2014.pdf](http://www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Ge-fitinib_monograph_1April2014.pdf). Acesso em Set/2022.

Guia Farmacêutico HSL. Acesso em Set/2022.



Aponte a câmera do seu celular e saiba mais sobre outros tratamentos.



## Alô enfermeiro

(17) 3201-5086

Contato telefônico para pacientes atendidos no Hospital de Base

**Elaborado por:** Equipe de Enfermagem, Farmácia e Nutrição do Serviço de Terapia Antineoplásica do Hospital de Base de São José do Rio Preto/ SP.

**Revisado por:** Dra. Aline Fusco Fares (médica oncologista), Ana Cláudia de Almeida Soares (farmacêutica oncológica), Isabela C. Antunes de Souza (enfermeira oncológica) e Natália F. Duran Leite (nutricionista)



HB ONCO